# Vesce commune de printemps



**Nom latin**
Vicia sativa

**Famille**
Légumineuses

**Densité***
40 kg/ha

**PMG (poids de mille grains)**
30 à 75 g

**Coût**
94 €/ha

* Valable pour un semis avec un combiné rotative-semoir

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Semences de taille modérée (idéal pour les mélanges) | Besoin d'une plante tuteur (préférable) |
| Bon engrais vert | Certaines variétés favorisent la multiplication d'Aphanomyces |
| Fourrage de qualité | |

## ASPECTS VÉGÉTATIFS

| Facilité d'implantation | Couverture de sol | Piégeage de l'azote | Rendement | Résistance à la sécheresse | Restitution d'azote |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Élevée | Moyen | Moyen | Élevée | Élevée |

Durée de l'interculture : **moyenne**

## ASPECTS AGRONOMIQUES

| Valorisation fourragère | Lutte contre les adventices | Sensibilité aux maladies | Effet sur la structure | Enracinement | Appétence aux limaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Fauche | Élevée | Faible à élevée (selon la variété) | Moyen | Pivotant | Faible |

## DATE DE SEMIS

Si valorisation fourragère :

| Période de récolte | Région | Date de semis |
|---|---|---|
| Automne | Nord du sillon Sambre & Meuse | du 1/06 au 15/08 |
| | Sud du sillon Sambre & Meuse | du 1/06 au 31/07 |
| Printemps | Nord du sillon Sambre & Meuse | / |
| | Sud du sillon Sambre & Meuse | / |

Si pas de valorisation fourragère :

| Région | Date de semis |
|---|---|
| Nord du sillon Sambre & Meuse | du 1/06 au 15/08 |
| Sud du sillon Sambre & Meuse | du 1/06 au 31/07 |

## TECHNIQUE DE SEMIS

| Technique de semis | Efficacité |
|---|---|
| À la volée | – |
| À la volée avec recouvrement/déchaumeur | + |
| Combiné rotative-semoir | ++ |

## MÉLANGE POSSIBLE AVEC : légumineuses, céréales

## DESTRUCTION - EFFICACITÉ

| Gel | Roulage en période de gel | Broyage | Labour | Déchaumage | Destruction chimique ** |
|---|---|---|---|---|---|
| + | + | – | +++ | +* | + |

*++ si déchaumeur à disques
** À partir de 2026 : destruction chimique interdite pour les couverts déclarés en « Eco-régime couverture longue du sol »

## ADAPTATION À LA CULTURE SUIVANTE

| Lin | Pomme de terre | Maïs | Betterave | Colza | Légumineuse (pois, féverole...) | Légume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet négatif, risque important de verse | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable sauf si présence de sclérotes | Déconseillé | Favorable sauf si présence de sclérotes |

## REMARQUES

- PGDA : Pour les mélanges CIPAN, à utiliser avec au moins une espèce non légumineuse, en respectant la règle de composition des CIPAN

PROTECT'eau